

KRKA oferuje najszersze portfolio połączeń peryndoprylu ze wszystkich firm generycznych



PRENESSA
peryndopryl

CO-PRENESSA
peryndopryl/ indapamid

AMLESSA
peryndopryl/ amlodypina

Roxiper
rozuwastatyna/ peryndopryl/ indapamid

CO-AMLESSA
peryndopryl/ amlodypina/ indapamid



Jakość buduje
zaufanie

	PERYNDOPRYL	AMLODYPINA	INDAPAMID	ROZUWASTATYNA	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA
PRENESSA	4 mg 8 mg	—	—	—	30 tabl.
CO-PRENESSA	2 mg 4 mg 8 mg	—	0,625 mg 1,25 mg 2,5 mg	—	30 tabl.
AMLESSA	4 mg 4 mg 8 mg 8 mg	5 mg 10 mg 5 mg 10 mg	—	—	30 tabl. 90 tabl.
CO-AMLESSA	4 mg 4 mg 8 mg 8 mg	5 mg 10 mg 5 mg 10 mg	1,25 mg 1,25 mg 2,5 mg 2,5 mg	—	30 tabl.
Roxiper	4 mg 4 mg 8 mg 8 mg	—	1,25 mg 1,25 mg 2,5 mg 2,5 mg	10 mg 20 mg 10 mg 20 mg	30 tabl.

**NOWE
POŁĄCZENIE!**

W tym miejscu znajdują się Charakterystyki Produktu Leczniczego Prenessa®, Co-Prenessa®, Amlessa®, Co-Amlessa®, Roxiper®, które stanowią nieodłączną część niniejszej reklamy.

Szczegółowe informacje dostępne na życzenie:



KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa
tel.: 22 573 75 00, faks: 22 573 75 64, e-mail: info.pl@krka.biz, www.krkapolska.pl

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000025060,
NIP: 526-10-31-829, Numer REGON: 010164219, Kapitał zakładowy: 17 490 000,00 zł.

Piśmiennictwo: <https://www.lekinfo24.pl/opis-leku/l,perindopril-peryndopryl,dp,doustna,mnid,1391.html>; stan na dzień: 02.08.2019r.

AMLESSA_IMK_P_EVENT_30_2019-0055679

Zaburzenia układu nerwowego	Zawrot głowy pochodzenia ośrodkowego	Często	-	Często
	Ból głowy	Często	Rzadko	Często
	Drganie	-	-	Niezbyt często
	Niedoczulica	-	-	Niezbyt często
	Parastęże	Często	Rzadko	Niezbyt często
	Nadciśnienie	-	-	Bardzo rzadko
	Neuropatia obwodowa	-	-	Bardzo rzadko
	Zaburzenia pozapiramidowe	-	-	Nieznana
	Zaburzenia smaku	Często	-	Niezbyt często
	Senność	Niezbyt często*	-	Często
	Omdlenie	Niezbyt często*	Nieznana	Niezbyt często
	Udar, prawdopodobnie wtórny do znacznego niedociśnienia u pacjentów z grupy dużego ryzyka	Bardzo rzadko	-	-
	Możliwe wystąpienie encefalopatii wątrobowej w przypadku niewydolności wątroby	-	Nieznana	-
Zaburzenia oka	Zaburzenia widzenia	Często	Nieznana	Często
	Kłótkowzroczność	-	Nieznana	-
	Niewyraźne widzenie	-	Nieznana	-
Zaburzenia ucha i błędnika	Zawrot głowy pochodzenia błędnikowego	Często	Rzadko	-
Zaburzenia serca	Szum uszny	Często	-	Niezbyt często
	Kołatanie serca	Niezbyt często*	-	Często
	Tachykardia	Niezbyt często*	-	Niezbyt często
	Dławica piersiowa	Bardzo rzadko	-	-
	Zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, tachykardia komorowa, migotanie przedsionków)	Bardzo rzadko	Bardzo rzadko	Niezbyt często
	Zawał mięśnia sercowego, prawdopodobnie wtórny do znacznego niedociśnienia u pacjentów z grupy dużego ryzyka	Bardzo rzadko	-	Bardzo rzadko
Zaburzenia naczyń	Częstoskurcz typu torsade de pointes (potencjalnie zakańczony zgonem)	-	Nieznana	-
	Naogół zacerwienie skóry, zwłaszcza twarzy	-	-	Często
	Niedociśnienie tętnicze (i objawy związane z niedociśnieniem)	Często	Bardzo rzadko	Niezbyt często
	Zapalenie naczyń krwionośnych	Niezbyt często*	-	Bardzo rzadko
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia	Objaw Raynauda	Nieznana	-	-
	Kaszel	Często	-	Niezbyt często
	Duszność	Często	-	Często
	Skurcz oskrzeli	Często	-	Często
	Ecymoflowe zapalenie płuc	Bardzo rzadko	-	-
Zaburzenia żołądka i jelit	Ból brzucha	Często	-	Często
	Zaparcie	Często	Rzadko	Często
	Biegunka	Często	-	Często
	Niestrawność	Często	-	Często
	Zmiana rytmu wypróżnień	-	-	Często
	Nudności	Często	Rzadko	Często
	Wymioty	Często	Niezbyt często	Niezbyt często
	Suchość błony śluzowej jamy ustnej	Często	Często	Często
	Zapalenie trzustki	Bardzo rzadko	Bardzo rzadko	Bardzo rzadko
	Zapalenie błony śluzowej żołądka	-	-	Bardzo rzadko
	Jadłowięt	Często	Często	-
Rozrost drążaś	-	-	Bardzo rzadko	
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych	Zapalenie wątroby	Bardzo rzadko	Nieznana	Bardzo rzadko
	Żółtaczka	-	-	Bardzo rzadko
	Zaburzenia czynności wątroby	-	Bardzo rzadko	-
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej	Obrzęk Quinckego	-	-	Bardzo rzadko
	Obrzęk naczynioruchowy	Niezbyt często	Bardzo rzadko	Bardzo rzadko
	Świąd	Często	-	Niezbyt często
	Wyсыпка	Często	-	Niezbyt często
	Wyсыпка plamkowo-grudkowa	-	Często	-
	Pokrzywka	Niezbyt często	Bardzo rzadko	Niezbyt często
	Wykwity	-	-	Niezbyt często
	Łysienie	-	-	Niezbyt często
	Plamica	-	Niezbyt często	Niezbyt często
	Przebarwienie skóry	-	-	Niezbyt często
	Nadmierne pocenie	Niezbyt często	-	Niezbyt często
	Reakcja nadwrażliwości na światło	Niezbyt często*	Nieznana	Bardzo rzadko
	Pemfigoid	Niezbyt często*	-	-
	Nasilenie łuszczyca	Rzadko*	-	-
	Rumień wielopostaciowy	Bardzo rzadko	-	Bardzo rzadko
	Toksyczne martwice oddzielające się naskórka	-	Bardzo rzadko	Nieznana
	Złuszczające zapalenie skóry	-	-	Bardzo rzadko
Zespół Stevensa-Johnsona	-	Bardzo rzadko	Bardzo rzadko	
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej	Kurcze mięśni	Często	-	Często
	Obrzęk okolicy kostek	-	-	Często
	Możliwe nasilenie istniejącego wcześniej ostrego tocznia rumieniowatego układu	Niezbyt często	Niezbyt często	-
	Ból stawów	Niezbyt często*	-	Niezbyt często
	Ból mięśni	Niezbyt często*	-	Niezbyt często
Zaburzenia nerek i dróg moczowych	Ból pleców	-	-	Niezbyt często
	Niewydolność nerek	Niezbyt często	-	-
	Ostra niewydolność nerek	Bardzo rzadko	Bardzo rzadko	-
Zaburzenia układu narządowego i piersi	Zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy, częste oddawanie moczu	-	-	Niezbyt często
	Zaburzenia erekcji	Niezbyt często	-	Niezbyt często
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania	Ginekostasia	-	-	Niezbyt często
	Obrzęk	-	-	Bardzo często
	Astenia	Często	-	Często
	Ból w klatce piersiowej	Niezbyt często*	-	Niezbyt często
	Ból	-	-	Niezbyt często
	Złe samopoczucie	Niezbyt często*	-	Niezbyt często
	Obrzęk obwodowy	Niezbyt często*	-	Bardzo często
	Gorączka	Niezbyt często*	-	-
	Zmęczenie	-	Rzadko	Często

